



АТЛАС


«Эндемики Крыма»

ЭНДЕМИКИ (от греч. *Endemos* - местный) –
виды (роды, семейства и т. д.) растений и
животных, ограниченные в своем
распространении относительно небольшой
территорией. Эндемичные виды растений и
животных, в связи с ограниченным ареалом и,
следовательно, ограниченной численностью,
часто заносятся в Красные книги как редкие
или исчезающие виды.

Пион крымский




Многолетнее травянистое растение 40–70 см высотой с утолщенным клубневидным корнем. Стеблей несколько, они прямостоячие, разветвленные. Листья кожистые, сизовато-зеленые, дважды тройчатые, с широкоовальными или почти округленными листочками до 3–6 см шириной. Цветки крупные, до 7–9 см в диаметре, одиночные, от лиловато-розовых до красных. Плод из 2–5 густо опушенных листовок с черными крупными семенами.



Жужелица крымская




Крупный жук длиной 35–52 мм. Верх тела и бока груди синие, зеленые или фиолетовые, обычно сильно блестящие. Верх в грубой скульптуре, надкрылья крупнозернистые.



Мачок желтый




Двулетнее или многолетнее сизовато-зеленое травянистое полурозеточное растение высотой 20–50 см. Стеблевые листья лировидно-перисторассеченные, до 30 см длиной. Бутоны яйцевиднопродолговатые, острые, длиной 2–6 см. Цветки одиночные, правильные, 2–5 см в диаметре, желтые, с двумя чашелистиками и четырьмя лепестками без нектарника. Плод – удлиненная (до 25 см) стручковидная коробочка.



Геккон крымский




Мелкая ящерица с длиной тела до 55 мм и примерно равной длины хвостом. Окраска изменяется от серой до буроваточерной в зависимости от физиологического состояния и фона субстрата. Брюхо желтоватобелое, хвост снизу охристый. Глаза лишены век; зрачок вертикальный.



Скорпион крымский




Единственный представитель отряда в фауне Крыма. Мелкий скорпион с длиной тела до 40 мм. Сверху светло-желтый, головогрудной щит темнее брюшка, снизу беловатый. Клешни педипальп красновато-бурые. В ультрафиолетовом свете кутикула монотонная, голубовато-серая.



Боярышник Поярковой




Дерево или кустарник 3–6 м высотой. Листья 3–5 см длиной, от простых 3-лопастных до 5–7раздельных, светло-зеленые от обильного опушения. Соцветия компактные, щитковидные, 4.5–5 см в диаметре, 6–12-цветковые, цветоножки и чашечки войлочно опушенные. Цветки белые, до 15 мм в диаметре. Плоды крупные, 15–25 мм в диаметре, округлые или грушевидные, лимонножелтые, с 3–5 косточками.



Коктебельский тюльпан




Многолетнее луковичное растение высотой 8–20 см. Луковицы с темно-бурыми оболочками. Стебель голый, зеленовато-коричневый. Прикорневые листья линейные, в числе 2–3 штук, серповидно изогнутые, сизоватые, с тусклым пурпурным окаймлением, до 18 см длиной. Цветки одиночные, реже по 2–3, листочки околоцветника до 3.5 см длиной, внутренние – белые с большим желтым пятном изнутри, наружные – с внешней стороны грязновато-бледно-фиолетовые. Плод – широкояйцевидная коробочка длиной до 2.2 см и шириной до 1.5 см, вскрывающаяся тремя створками.



Пострел крымский



Многолетнее травянистое растение с хорошо развитым корневищем и побегами высотой 3–4 см, которые в фазе плодоношения увеличиваются до 30–35 см. Листья в прикорневой розетке, дважды перисторассеченные на ланцетные доли, вырастают к концу цветения. Цветки одиночные, до 8–10 см в диаметре, колокольчатовидные. Околоцветник из 6 фиолетовых свободных листочков, снаружи шелковистоволосистых. Плод – многоорешек с длинными (до 3–4 см) беловолосистыми осями.



Цикламен Кузнецова



Многолетнее травянистое растение высотой 10–15 см с округлоуплощенным клубнем до 5–8 см в диаметре. Листья широкояйцевидные с длинными фиолетовыми черешками и сердцевидным основанием, темно-зеленые, сверху – серебристо-белые, снизу – фиолетовые, в прикорневой розетке. Цветки одиночные, лопасти венчика яйцевидные, отогнутые, при основании сросшиеся, сиренево-розовые, с фиолетовым пятном в нижней части и двумя белыми пятнами при отгибе. Плод – округлая коробочка на спирально скрученной плодоножке.



Кендырь Крымский



Многолетнее длиннокорневищное растение 0.5–1.2 м высотой, образует густые заросли прямостоячих и восходящих побегов. Листья супротивные, ланцетные, 3.5–6.5 см длиной и 1–2 см шириной. Соцветие – верхушечная метелка, цветки 5–8 мм длиной, венчик пятичленный, колокольчатый, сростнолепестный, розово-сиреневый.



Бурозубка Малая



Длина тела – 50–65 мм, хвоста – 35–42 мм, масса тела – 2.5–5.2 г. Окраска меха двуцветная: спина от коричнево-бурой до темнобурой, брюшко серебристосерое, хвост одноцветный, относительно длинный и толстый, сильно опушенный, веретеновидной формы. Рострум тонкий, удлинённый, зубы мелкие, острровершинные, слабо пигментированные.



Сойка крымская




Некрупная, величиной с галку, птица с пушистым рыхлым оперением, заметным широким хохлом, сравнительно короткими крыльями и довольно длинным хвостом. Крылья, хвост, а у кавказских и крымских птиц и верх головы черные, надхвостье белое, на плечах ярко-голубые с узкими черными полосками перья, остальное оперение рыжевато-коричневато-серое, у сибирских птиц голова рыжая, у европейских — беловатая с продольными бурыми пестринами.

Населяет лиственные, смешанные, реже чисто хвойные леса. Обычная кочующая птица. В гнездовой период скрытна, в остальное время крикливая, заметная птица. Держится парами и стайками на деревьях, кустах и на земле. Полет тихий, тяжелый.

Олеандровый Бражник

Отличается от других бражников Крыма крупными размерами и красивым сложным рисунком передних крыльев с преобладанием темно-зеленого и крупными фрагментами фиолетового, зеленовато-белого и розоватого цветов. Размах крыльев – 90–125 мм.



Альпийский Усач



Относительно крупный жук, длина тела – 15–38 мм. Черный, в густом светло-сером или голубом опушении. Усики и ноги обычно в синеватых волосках, усики с черными колечками на вершине. Переднеспинка с черным пятном около переднего края. Диск переднеспинки на боковом крае посередине с тупым, косо направленным кверху шипом с блестящей вершиной. Надкрылья вытянутые, параллельносторонние, на основании в блестящих плоских бугорочках, каждое с краевым пятном в основной трети, широкой перевязью у середины и небольшим пятном в вершинной трети; пятна и перевязь черные с узкой светлой каемкой. Усики самца в 1.5–1.7 раза длиннее тела, у самки заметно заходят за вершину надкрылий.

